

# POZOR NA PTAČÍ CHŘÍPKU!



## informace pro chovatele



Státní  
veterinární  
správa

### Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

### Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

### Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělení chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinfekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi



Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

[WWW.SVSCR.CZ](http://WWW.SVSCR.CZ)




Státní  
veterinární  
správa

# Ptačí chřipka


## Preventivní opatření v drobnochovech

Jaro a podzim jsou období, kdy dochází k migraci volně žijících ptáků, zvláště pak vodních. V tomto období existuje zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže.

Proto je nutné zajistit, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování preventivních opatření v chovech.



1. Držte drůbež v uzavřených objektech. Krmivo a vodu podávejte v uzavřeném přístřešku.



2. Zabraňte přístupu volně žijících ptáků, hlodavců i jiných zvířat do chovu (plachty, sítě).



3. Dodržujte osobní hygienu. Převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu.



4. Sledujte zdraví drůbeže. Zvýšené hnutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání mohou být příznaky chřipky.



5. Zvýšené úhyny drůbeže nahlaste Státní veterinární správě nebo svému veterinárnímu lékaři.



6. S podezřelou a uhynulou drůbeží (ptáky) manipulujte opatrně a pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky).



Více informací  
o ptačí chřipce  
naleznete na  
[www.svscl.cz](http://www.svscl.cz)